

(たちしのぶ), *Pentarhizidium japonicum* Hayata (いぬがんそく), *Phegopteris* *decursive-pinnata* Fée (げじげじした), *Phymatopsis hastata* Kitagawa (みつでうらぼし), *Polystichum craspedosorum* Diels (つるでんだ), *P. japonicum* Diels (ゐので), *P. Makinoi* Tagawa (かたゐので), *P. polyblepharum* Presl (ひめかなわらび), *P. retroso-paleaceum* Tagawa var. *ovato-paleaceum* Tagawa (つやなしゐので), *P. tripterum* Presl (じふもんじした), *Pteridium aquilinum* Kuhn var. *japonicum* Nakai (わらび), *Pteris cretica* Linnaeus (おほばのゐのもとさう), *P. dispar* Kunze (あまくさした), *P. inaequalis* Baker var. *aequata* Tagawa (おほばのはちぢやうした), var. *simplicior* Tagawa (おほばのあまくさした), *P. multifida* Poiret (ゐのもとさう), *Pyrrosia hastata* Ching (いはおもだか), *Rumohra amabilis* Ching (おほかなわらび), *R. aristata* Ching var. *pseudoaristata* H. Ito (こばのかなわらび), var. *typica* H. Ito (ほそばかなわらび), *R. simplicior* Ching var. *major* H. Ito (おにかなわらび), var. *typica* H. Ito (はかたした), *R. Standishii* Ching (りやうめんした), *Spcantopsis nipponica* Nakai var. *japonica* Nakai (ししがしら), *Stenoloma chusanum* Ching (ほらしのぶ), *Taraxia Wilfordii* H. Ito (あながねした), *Thelypteris glanduigera* Ching var. *typica* H. Ito (はしごした), *T. japonica* Ching (はりかねわらび), *T. laxa* Ching (やはらした), *T. oligophlebia* Ching var. *elegans* Ching (ひめわらび), *T. palustris* Schott (ひめした), *Vittaria flexosa* Fée (ししらん), *Woodwardia orientalis* Swartz (こもちした), *W. unigemmata* Nakai (じようれんした)。

Gleicheniaceae うらじろ科

*Dicranopteris dichotoma* Bernhardi (こした), *D. glauca* Nakai (うらじろ)。

Lygodiaceae かにくさ科

*Lygodium japonicum* Swartz (かにくさ)。

Osmundaceae ぜんまい科

*Osmunda japonica* Thunberg (ぜんまい)。

〇しやしやんぼノ方言わくらニ就テ (前川文夫)

わくら又へわくらばトイヒ私ノ郷里ノ三重縣中部デモ同様デアル。コレハ病葉ノ意味デ、ユカシイ古語ガ殘ツタモノト考ヘラレルガ、ドコガ病葉ヲ聯想サセルノカトイフニ、牧野先主ハ紅色ノ嫩葉ガ舊葉ト混ジテ居ル際ニコレヲ病葉ニ見立テタモノト云ハレテ居ル。本種ハ常緑樹デアルガ、葉ガ古クナルト(殊ニ年ヲ越スト)褐色乃至縹紫色デ、シカモ白味ヲ混ヘタ様ニ見エルトコロノ病斑様ノ膚色ガ表面ニアラハレテ來ル。ソレガ中々著シイ株ガアル。寧ロコノ事ガわくらノ名ガ附イタモトデハナカロウカ。